



PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA – PSR 2026

RESPOSTAS AOS RECURSOS

ENFERMAGEM

QUESTÃO 26.

26. Um CME recebe instrumental “visivelmente limpo” e decide encaminhar direto à esterilização sem etapa formal de limpeza por economia de tempo. Qual posicionamento é aderente ao marco sanitário, considerando a RDC nº 15/2012?

- A) Rejeitar e reforçar fluxo completo, incluindo limpeza e etapas validadas antes da esterilização.
- B) Aceitar, pois a esterilização compensa falhas de limpeza quando há temperatura adequada.
- C) Aceitar, desde que o pacote seja duplo e o ciclo seja prolongado.
- D) Aceitar se houver indicador químico externo com mudança de cor.

Alternativa correta alterada para letra “A” - Justificativa: A limpeza é etapa indispensável, pois resíduos orgânicos podem proteger microrganismos durante a esterilização.

ODONTOLOGIA

QUESTÃO 16

16. Durante o planejamento de um tratamento endodôntico em molares superiores, a equipe discute os princípios da cavidade de acesso coronário para garantir a localização de todos os canais e o acesso direto ao terço apical. De acordo com os protocolos de abertura coronária, a forma de conveniência correta para esses elementos é:

- A) Triangular com base voltada para a face palatina.
- B) Trapezoidal com base maior voltada para a face vestibular.
- C) Triangular com base voltada para a face vestibular.
- D) Ovalada com maior eixo no sentido mesiodistal.

Alternativa correta mantida letra “C” – Justificativa: Segundo ALMEIDA, C.; FERREIRA, R. (2022), Página 24, Capítulo 4 (Acesso Coronário):

"A forma de conveniência para molares superiores é triangular, com a base voltada para a face vestibular e o ápice para a palatina."

QUESTÃO 29

29. Ao analisar uma radiografia panorâmica de um paciente adulto, o dentista observa uma lesão multilocular radiolúcida com padrão de "bolhas de sabão" no ângulo da mandíbula. Considerando um tumor odontogênico benigno com comportamento localmente invasivo, a hipótese diagnóstica é:

- A) Ameloblastoma.
- B) Ceratocisto odontogênico.
- C) Odontoma composto.
- D) Mixoma odontogênico.

Alternativa correta mantida letra "A" – Justificativa: Segundo NEVILLE, B.W. et al. (2009) — Patologia oral e maxilofacial, Página 610, Capítulo 15 (Tumores Odontogênicos):

"O ameloblastoma é o tumor odontogênico clinicamente mais comum e importante; radiograficamente, exibe frequentemente uma aparência multilocular descrita como bolhas de sabão."

QUESTÃO 31

31. Na interpretação de uma radiografia periapical da região de molares superiores, o dentista observa uma linha radiopaca em formato de "U" ou "V" projetada sobre as raízes do primeiro molar. Essa imagem anatômica corresponde ao:

- A) Seio maxilar.
- B) Processo estiloide.
- C) Forame palatino maior.
- D) Processo zigomático da maxila.

Alternativa correta mantida letra "D" – Justificativa: Segundo OLIVEIRA, A.E.F. (2014) — Radiologia odontológica: princípios de interpretação, Página 14, Unidade 1:

"O processo zigomático da maxila aparece radiograficamente como uma linha radiopaca em forma de U ou V, localizada acima das raízes dos molares superiores."

QUESTÃO 44

44. manobra de Chompret-Guérin é um procedimento auxiliar utilizado para o tratamento de:

- A) Luxação recidivante da ATM.
- B) Fraturas de mandíbula por arma de fogo.
- C) Fraturas de maxila do tipo Le Fort I.
- D) Anquilose fibrosa da articulação temporomandibular.

Alternativa correta mantida letra "C" – Justificativa: Segundo PRADO, R.; SALIM, M. (2018) — Cirurgia bucomaxilofacial: diagnóstico e tratamento, Página 342, Capítulo de Trauma de Face:

"A manobra de Chompret-Guérin consiste na apreensão da maxila para sua mobilização e reposicionamento em fraturas Le Fort I."

FARMÁCIA

QUESTÃO 28

28. No balcão de dispensação, um farmacêutico avalia a documentação necessária para a venda de um antibiótico de uso sistêmico. Segundo a RDC ANVISA nº 20/2011, o controle desses antimicrobianos exige que a receita:

- A) Ser apresentada em via única, ficando o original com o paciente.
- B) Ser emitida em duas vias, sendo a 1ª via retida pela farmácia e a 2ª via devolvida ao paciente.
- C) Ter validade de 30 dias a partir da data de emissão para todo o Brasil.
- D) Ser escrita obrigatoriamente à mão, sendo proibido o uso de meios eletrônicos.

Alternativa correta mantida letra "B" – Justificativa: Segundo Artigo 13 da RDC 20/2011:

"Art. 13. A dispensação de antimicrobianos deve ser efetuada mediante a retenção da 1ª via da receita, devendo a 2ª via ser devolvida ao paciente."

NUTRIÇÃO

QUESTÃO 38 FOI ANULADA SEM RECURSO, EM VIRTUDE DE O ENUNCIADO CONTER UMA INCORREÇÃO DE IMPRESSÃO

QUESTÃO 16

16. Durante o atendimento em uma unidade de emergência, um lactente de 5 meses apresenta urticária generalizada e angioedema minutos após a ingestão acidental de um preparo contendo leite de vaca. Diante da suspeita de anafilaxia e considerando as diretrizes da ASBAI (2023) sobre alergia alimentar, a conduta imediata deve ser:

- A) Administrar corticoide via oral e observar a progressão dos sintomas por 2 horas.
- B) Oferecer anti-histamínico de segunda geração e aguardar a remissão das placas.
- C) Aplicar adrenalina por via intramuscular na face anterolateral da coxa.
- D) Realizar nebulização com soro fisiológico para umidificar as vias aéreas superiores.

Alternativa correta mantida letra "C" – Justificativa: Segundo ASBAI (2023) — Página 4, Seção Tratamento:

"A adrenalina é a medicação de primeira escolha no tratamento da anafilaxia e deve ser administrada precocemente por via intramuscular."

A questão não estabelece qual profissional deve realizar a aplicação, logo não se trata de exercício irregular do nutricionista.

QUESTÃO 26

26. Um paciente idoso hospitalizado em risco nutricional não consegue atingir 60% de suas necessidades calóricas diárias apenas com a dieta oral oferecida. Segundo o manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar do SUS, a conduta recomendada é:

- A) Aguardar mais 7 dias para observar se o apetite retorna espontaneamente.
- B) Iniciar o uso de suplementos nutricionais orais entre as refeições.
- C) Suspender a alimentação e manter apenas hidratação venosa simples.
- D) Realizar jejum pré-operatório prolongado para "limpar" o trato digestivo.

Alternativa correta mantida letra "B" – Justificativa: Segundo BRASIL (2016) — Manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no SUS, Página 28, Seção 4.3:

"Quando a ingestão oral for insuficiente para atingir as necessidades nutricionais, recomenda-se o uso de suplementos orais."

QUESTÃO 42

42. Durante a introdução da alimentação complementar para um lactente, a família questiona sobre o uso de temperos. Conforme o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, a recomendação correta quanto ao uso de sal é:

- A) Não usar sal em nenhuma preparação antes dos 2 anos de idade.
- B) Usar sal livremente para garantir que o bebê aceite o sabor dos vegetais.
- C) Usar sal em quantidade mínima e apenas para realçar o sabor, priorizando temperos naturais.
- D) Usar apenas sal grosso triturado, por ser mais natural que o sal refinado.

Alternativa correta mantida letra "C" – Justificativa: Segundo BRASIL (2021) — Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, Página 25, Passo 4:

"O sal deve ser usado em quantidades mínimas, priorizando o sabor natural dos alimentos e o uso de temperos naturais."